安胎症狀與檢查:7點安胎注意事項,家人支持、放鬆安胎最重要!

文章

10 月 6, 2022

2 MINS

平安產下健康的寶寶,是每個懷孕媽媽最大的心願,然而現實有可能不如預期, **所以建議孕媽媽在發現有早產症狀時,就要好好安胎,遵照醫生指示好好休息**, 對胎兒的健康才有幫助。

安胎是幫助胎兒孕期能夠穩定的方法,導致孕期不穩定的原因很多,而且複雜。此外,安胎是會讓孕婦感到焦慮事,所以除了醫師使用安胎藥物來控制孕期穩定外,身邊家人也需要適時提供孕婦安定的力量。

為什麼要安胎?幫助媽咪穩定胎兒,讓寶寶在媽咪肚內安全完整發育

安胎的主要目的是讓孕期能夠穩定,讓肚子裡的胎兒,能夠發育完全之後在出來, 降低早產和流產風險。只要胎兒能夠待到足月在出來,不僅身體發育較完全,早 產的併發症和風險就會將低很多。

就算不能延長到足月在出生,只要安胎至34-35週左右,胎兒早產的併發症會降低非常多,胎兒出生成功率也會有所增加。

什麼時候要安胎? 有這些症狀可能需要安胎?

胎兒尚未滿足月時出生,就稱為早產兒,而安胎就是在胎兒未滿足月時,出現生 產徵兆時需要進行的。而所謂**生產徵兆,就是例如陰道分泌物伴隨出血、子宮收 縮、子宮擴張、懷孕早期破水、陰道出血等等。**

而這些胎兒早產的生產徵兆可能的原因有相當多種,也有尚未了解的原因,下列

幾項原因最為常見:

- 懷孕年齡在18歲以下,40歲以上
- 妊娠高血壓、妊娠糖尿病、子癲前症
- 多胞胎
- 母體感染
- 子宮頸閉鎖不全
- 前置胎盤

若有以上情況的媽媽,也可以在生產狀況還未發生時,就提早跟醫生討論,讓肚子裡的胎兒較有保障。

安胎檢查和治療: 5 項常見安胎檢查, 臥床多休息很重要

醫生在決定是否需要安胎之前,除了從媽媽的早產症狀判斷外,也需要做一系列的檢查,像是:

- 做抽血和尿液檢查
- 內診
- 超音波檢查
- 胎兒監視器

• 陰道細菌培養

抽血驗尿 內診 超音波 胎兒 陰道細菌培養

檢查胎兒肺部 成熟度 檢查子宮頸開檢查胎兒情況 指情況 羊水量

檢查胎兒心檢查是否受到感 跳 染

是否有出血點胎盤成熟度

各項安胎檢查項目與檢查目的一覽表

做完檢查後,醫生會評估胎兒狀況及母體情況是否適合安胎,如果適合安胎,安胎的治療方式,有下列這些:

• 醫師開立安胎藥物

醫師會根據每個孕婦情況,來決定安胎藥是要採用口服或是注射,而**安胎藥可以幫助子宮的收縮,減少出血,但同時也伴隨著心悸、呼吸不順等副作用,**孕婦也可以及時向醫師反應身體情況。

• 定期身體檢查

在安胎期間,需要定期做超音波還有抽血驗尿的檢查,目的是知道現在胎兒情況,以及母體是否適合繼續安胎。

• 住院臥床休息

安胎期間,孕婦需要採用平躺的方式,讓子宮收縮緩解,出院之後也盡量 多臥床休息,觀察子宮收縮的情況,同時要保持心情的穩定。

在返家之後,孕婦也盡量多臥床休息,避免性生活,並遵照醫師指示服用藥物, 也要自己注意子宮收縮強度,若收縮強度過強,則需要跟醫師討論是否住院安胎。 儘管被要求長期待在床上,心情會很不好受,但為了肚子中的胎兒,還是要請媽媽們多擔待。另外也需要注意水量的控制,避免肺水腫情況發生。

長期待在床上,孕婦也可以找機會多活動身體,可以做腳踝關節的活動,讓身體血液達到循環。餐點也盡量清淡,但因為無法運動,所以胃口可能較差,可以採用少量多餐的方式。



安胎食物怎麼吃?安胎期間懷孕媽咪身體較虛弱,

安胎中孕婦需要注意攝取的食物,以免對胎兒及安胎有所影響。把握以下食物禁忌與注意事項,讓安胎飲食不再困難。

安胎期間應該避免的食物:

- 避免吃辣的、刺激性的食物
- 避免吃高熱量的食物

- 避免垃圾食物
- 加工水果
- 醃製品
- 罐頭類
- 高糖飲料

看完安胎期間應該避免的食物後,那麼安胎期間應該怎麼吃呢?由於安胎期間媽媽們的身體偏虛弱,腸胃能力也會隨之下降,所以食物可盡量吃清淡一點,同時也有一定的營養價值,像是粥類就搭配幾項蔬菜以及蛋白質,就是常見安胎的飲食選擇。

另外,也需要注意營養均衡, 六大類食物都要攝取,除了上述應該避免的食物外,只要孕媽媽想吃、可以吃的,都可以在安胎期間吃。

7 個安胎注意事項: 安胎之路需要家人的陪伴,幫助媽咪順利產下健康寶寶

安胎要注意事情很多,以下整理了幾點關於安胎,必須注意的事項,供需要安胎的媽媽們參考:

- 避免過度操勞
- 保持心情愉快
- 避免菸酒類
- 觀察胎動

- 避免性生活
- 時常測量血壓
- 尋求家人支持

安胎期間媽媽們,心情會更不穩定,子宮收縮會讓身體也會相當不舒服,**這個時候很需要丈夫、家人在旁,讓媽咪在安胎期間更加安定:有更多的人來一起陪伴**安胎中的媽媽,注意安胎期間的飲食與作息,同時也可以協助還有分擔家務,讓安胎媽媽能夠專心養胎,幫助寶寶健康出生。



懷孕初期、晚期安胎應該如何安胎? 安胎相關 Q&A 整理

Q1.懷孕各個時期,安胎要做的會有所不同嗎?

針對懷孕的各個時期,所要做的安胎方式大多相同,可參考上述 6 點安胎注意事項來進行安胎。

懷孕媽媽在各階段的安胎期間,都盡量不要過於操勞,同時保持心情愉快,並時常關注自己的身體變化,以及寶寶胎動,讓安胎期間成功安穩的度過。

唯在醫師開立的藥物上較不盡相同:懷孕初期安胎,醫師開立的藥物多會主要多以黃體素來幫助胎兒穩定。而懷孕後期的藥物則比較多元,醫師依照每個孕婦的情況決定,像是懷孕中後期,醫師有實開立預防子宮收縮的藥。

但不論是懷孕初期或是懷孕晚期,是否需要進行安胎、以及詳細的安胎方式,還是需要視醫師的診斷為主。

Q2.安胎一定要躺著嗎? 臥床安胎姿勢哪個好?

基本上還是建議需要安胎的孕婦媽媽,生活盡量都以臥床安胎為主,使子宮收縮 獲得解,並盡量將走動及站立的時間減到最少。

朝左臥躺對於血液循環有幫助,建議不要都完全平躺休息,因為平躺會壓迫到靜脈,長期下來可能導致血液循環不佳。不過,臥床的方式主要還是孕婦舒服為主,並沒有限定要怎麼躺。

Q3.吃安胎藥還是流血怎麼辦?

懷孕安胎期間,最常吃的安胎藥就是黃體素,也就是常聽到的安胎藥小白球,是懷孕初期的安胎藥,可以放鬆子宮,讓子宮不再收縮的那麼嚴重,也對於黃體素不足,而導致出血的媽媽很有幫助。

若吃安胎藥之後還是出血,那很有可能是安胎藥,無法解決早產的症狀,建議盡早就醫,找醫師諮詢及進一步處置。

重點摘要:

- 安胎的主要目的是讓孕期能夠穩定,希望讓寶寶足月在出生
- 有生產徵兆,經醫師判斷後就需要進行安胎
- 安胎檢查: 抽血、驗尿、內診、超音波檢查、胎兒監視器、陰道細菌培養
- 安胎處置: 醫師開立安胎藥、定期身體檢查、臥床休息
- 安胎食物應避免刺激性的、高熱量、高糖高鹽及加工食物

參考資料:

- 1. 安胎注意事項-馬偕紀念醫院 (link)
- 2. 懷孕了!什麼情況需要安胎? (link)
- 3. 安胎注意事項-林新醫院 (link)

立即分享